



# Maîtriser l'épandage

## Bien répartir son lisier au bon moment sur l'exploitation


30 m<sup>3</sup>/ha = besoins en Phosphore (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) et Potasse (K<sub>2</sub>O) de la plante

### Prairies

**Effet starter** d'un épandage en fin d'hiver et printemps, mais attention aux **risques sanitaires**:

- L'enfouissement direct du lisier diminue les risques sanitaires.
- Sinon délai minimal de 1 mois entre l'épandage et le pâturage ou la fauche.

L'appétence de l'herbe peut être diminuée si le délais n'est pas respecté ou lors d'absence totale de pluie entre l'épandage et le pâturage.



### Céréales

L'apport de lisier peu remplacer l'apport d'azote prévu au stade **début montaison**.

### Maïs

**Effet starter** du lisier épandu avant ou juste après le semis. Le lisier apporté au **stade 6-8 feuilles** est très bien valorisé.

## Epandre régulièrement et au bon moment

	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Févr	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août
Culture d'automne							c					
Culture de printemps							c	c				
Prairie de plus de 6 mois		c	c			c	c	c	c			

■ Epandage interdit par la réglementation zone vulnérable    □ Epandage de lisier autorisé    □ c Epandage de lisier conseillé pour une bonne

## 4 règles à respecter


### Périodes

Les exigences concernant les périodes d'épandage sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

### L'état du sol

Etat du sol	Lisier
Détrempé ou inondé (ou en période de forte pluies)	<b>Interdit</b>
Couvert de neige	<b>Interdit</b>
Pris en masse par le gel	<b>Interdit</b>

### Distances



- Terres nues, enfouissement dans les 24 heures
- 50 m des habitations avec enfouissement dans les 12 heures ou traitement anti-odeur
- 10 m des habitations avec enfouissement direct dans le sol.

### Stockage

La fosse doit au minimum être étanche et pouvoir accueillir la production de lisier correspondant à la réglementation de l'exploitation:

RSD (zone vulnérable) → **2 mois**  
Déclaration → **4 mois**  
Autorisation → **6 mois**